Dipivoxilo de adefovir

Marca comercial: **Hepsera**

Clase de medicamento: **Infecciones oportunistas y otros**

El dipivoxilo de adefovir, conocido también como Hepsera, pertenece a la clase de medicamentos llamados análogos de los nucleósidos. Este producto bloquea la polimerasa del ADN del virus de la hepatitis B (VHB), una proteína que necesita ese virus para multiplicarse.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El dipivoxilo de adefovir está autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de la infección crónica por el VHB y se estudia como parte de un tratamiento conjunto en pacientes infectados simultáneamente por el VIH y el VHB y en pacientes con infección triple por el VIH, el VHB y el VHC (virus de la hepatitis C).

Presentación/Administración

El dipivoxilo de adefovir se fabrica en tabletas y puede tomarse con comida o solo.

Contraindicaciones

Las personas con enfermedades preexistentes deben informárselo al médico antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el dipivoxilo de adefovir puede causar algunos efectos adversos. Aunque no se conocen todos estos efectos secundarios, se han notificado dolor abdominal, coloración amarillenta de los ojos o la piel, deposiciones de color pálido, orina oscura, diarrea, fiebre, náusea, vómito, inapetencia, cefalea, dolor de garganta, constipación nasal, erupción cutánea, debilidad y dolores musculares. Es importante que las personas que toman este medicamento informen al médico si ocurre cualquier efecto secundario raro o molesto.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian dipivoxilo de adefovir, visite el sitio web de AIDSinfo: http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba dipivoxilo de adefovir. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español.

Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en http://www.clinicaltrials.gov para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Adefovir dipivoxil AND HIV infections.

Fabricantes

Adefovir dipivoxil
Gilead Sciences Inc
333 Lakeside Dr
Foster City, CA 94404
(800) 445-3235

Hepsera
Gilead Sciences Inc
333 Lakeside Dr
Foster City, CA 94404
(800) 445-3235

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

• al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este

• al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este